



Versió executiva de la Guia tècnica per a la campanya de vacunació antigripal 2018

Aquest document és un resum de la *Guia tècnica per a la campanya de vacunació antigripal estacional 2018* que es pot consultar al portal Canal Salut.

Els punts que cal destacar són els següents:

Data d'inici de la campanya

La campanya de vacunació començarà el dilluns 22 d'octubre de 2018.

Composició de la vacuna

En la composició de la vacuna trivalent d'aquesta temporada es manté la soca A/Michigan/45/2015 (H1N1)pdm09, i la resta de soques ha variat. La composició de les vacunes trivalents per a aquesta temporada, d'acord amb les recomanacions de l'OMS per a la temporada gripal 2018-2019 a l'hemisferi nord, ha d'incloure:

- Una soca anàloga a A/Michigan/45/2015 (H1N1)pdm09
- Una soca anàloga a A/Singapore/INFIMH-16-0019/2016 (H3N2)
- Una soca anàloga a B/Colorado/06/2017 (línatge Victòria)

L'OMS recomana que les vacunes antigripals tetravalents portin, a més de les soques anteriors, una soca anàloga a B/Phuket/3073/2013 (línatge Yamagata).

Font: http://www.who.int/influenza/vaccines/virus/recommendations/2018_19_north/en/

Grups de risc que cal vacunar

1. Persones d'edat igual o superior a 60 anys. Es farà èmfasi especial en aquelles persones que conviuen en institucions tancades.

2. Persones de menys de 60 anys que presenten un alt risc de complicacions derivades de la grip:

- Infants (a partir dels 6 mesos) i adults amb malalties cròniques cardiovasculars (exclosa la hipertensió arterial aïllada), neurològiques o respiratòries (inclòs l'asma, la displàsia broncopulmonar i la fibrosi quística).
- Infants (a partir dels 6 mesos) i adults amb:
 - diabetis mellitus



- obesitat mòrbida (índex de massa corporal ≥ 40 en adults, ≥ 35 en adolescents o ≥ 3 DE en la infància)
- malaltia renal crònica i síndrome nefròtica
- hemoglobinopaties i anèmies
- hemofília i trastorns hemorràgics crònics, i també receptors de hemoderivats i transfusions múltiples
- asplènia
- malaltia hepàtica crònica, inclòs l'alcoholisme crònic
- malalties neuromusculars greus
- immunosupressió (inclosa l'originada per la infecció pel VIH, per fàrmacs —inclòs el tractament amb eculizumab— o en els receptors de trasplantaments)
- càncer i hemopaties malignes
- implant coclear o en espera de l'implant
- fístula de líquid cefalorraquidi
- malaltia celíaca
- malaltia inflamatòria crònica
- trastorns i malalties que comporten disfunció cognitiva: síndrome de Down, demències i altres.

En aquest grup es farà èmfasi especial en aquelles persones que necessitin seguiment mèdic periòdic o que hagin estat hospitalitzades l'any precedent.

- Infants i adolescents, de 6 mesos a 18 anys, que reben tractament prolongat amb àcid acetilsalílic, per la possibilitat de desenvolupar una síndrome de Reye després de la grip.
- Persones de qualsevol edat institucionalitzades de manera perllongada.
- Dones embarassades en qualsevol trimestre de gestació.

3. Persones que poden transmetre la grip a aquelles que tenen un risc alt de presentar complicacions:

- Personal dels centres, serveis i establiments sanitaris (incloses les oficines de farmàcia), tant d'atenció primària com especialitzada i hospitalària; pública i privada. Es farà especial èmfasi en el personal que atén pacients d'alguns dels grups d'alt risc anteriorment descrits.
- Persones que, per la seva ocupació, treballen en institucions geriàtriques o en centres d'atenció a malalts crònics, especialment les que tinguin contacte continu amb persones vulnerables.
- Estudiants en pràctiques en centres sanitaris.
- Persones que proporcionin cures domiciliàries a pacients d'alt risc o gent gran.



- Persones que conviuen a la llar, inclosos infants a partir dels 6 mesos d'edat, amb altres que pertanyen a alguns dels grups d'alt risc, per la seva condició clínica especial (esmentades al punt 2).

4. Altres grups als quals es recomana la vacunació:

- Persones que treballen en serveis públics essencials, especialment en els subgrups següents:
 - Forces i cossos de seguretat de l'Estat, amb dependència nacional, autonòmica o local
 - Bombers
 - Serveis de protecció civil
 - Persones que treballen en els serveis d'emergències sanitàries
 - Treballadors d'institucions penitenciàries i d'altres centres d'internament per resolució judicial (inclosos centres d'acolliment d'immigrants)
- Persones amb exposició laboral directa a aus domèstiques o porcs, en granges o explotacions avícoles o porcínes, i també a aus salvatges. La finalitat és reduir l'oportunitat de coinfecció de virus humà i aviari o porcí, i disminuir la possibilitat de recombinació genètica d'ambdós virus.

Es recomana que les persones que pertanyen al grup de serveis públics essencials siguin vacunades pels mateixos serveis sanitaris que els corresponguin.

Malgrat l'existència de recomanacions d'algunes institucions, es recorda que per a la campanya antigripal 2018-2019 no es considera grup de risc –a l'efecte de rebre la vacunació antigripal de manera sistemàtica– la població sana, infantil o adulta menor de 60 anys, no inclosa en els apartats 1, 2 i 3.

Vacunes distribuïdes pel Departament de Salut per a la campanya de vacunació de l'any 2018

La Generalitat de Catalunya adquireix les vacunes mitjançant un concurs públic. En el concurs d'aquest any, els lots de vacunes que han estat adjudicats són:

Vacunes trivalents fraccionades o de subunitats

- 600.000 dosis de vacuna Chiroflu® de Seqirus
Vacuna antigripal d'antigen de superfície inactivat.

Vacunes trivalents d'immunogenicitat reforçada



- 600.000 dosis de vacuna Chiromas® de Seqirus

Vacuna antigripal d'antigen de superfície inactivat, amb adjuvant MF59C.1.

Vacunes tetravalents fraccionades

- 2.950 dosis de vacuna Fluarix tetra® de GSK de GlaxoSmithKline. Aquestes dosis s'utilitzaran hospitalàriament per a població de molt alt risc.

Les vacunes Chiroflu® i Chiromas® es distribuïran amb agulles amb sistemes de bioseguretat que se serviran en caixes independents:

- Chiroflu®: amb agulla de bioseguretat de color taronja.
- Chiromas®: amb agulla de bioseguretat de color blau.

Vegeu indicacions per tipus de vacuna a la taula 1.



Taula 1. Indicació d'ús de la vacuna antigripal per tipus

Nom comercial	Edat recomanada	Via d'administració	Tipus de vacuna	Població destinatària
Chiroflu®	A partir dels 6 mesos	Intramuscular o subcutània profunda	Subunitats	Administrar a totes les persones amb indicació de vacunació
Chiromas®	A partir dels 65 anys (No hi ha estudis que validen la seva administració abans d'aquesta edat)	Intramuscular	Immunogenicitat reforçada (adjuvada)	Utilitzar en persones > 65 anys Prioritzar-ne l'ús en persones d'edat avançada o que pertanyin a grups de risc
Fluarix tetra®	A partir dels 6 mesos	Intramuscular	Fraccionada	Us en persones de molt alt risc (ús exclusiu en hospitals)