

Versió executiva de la *Guia tècnica per a la campanya de vacunació antigripal 2019-2020*

Data d'inici de la campanya

La campanya de vacunació començarà el dilluns 28 d'octubre de 2019.

Més informació

[Material relacionat amb la campanya](#)

Composició de la vacuna

En la composició de la vacuna trivalent d'aquesta temporada es manté la soca B/Colorado/06/2017 (línatge Victòria), i la resta de soques han variat. La composició de les vacunes trivalents per a aquesta temporada, d'acord amb les recomanacions de l'OMS per a la temporada gripal 2019-2020 a l'hemisferi nord, ha d'incloure:

- **A/Brisbane/02/2018 (H1N1)pdm09**
- **A/Kansas/14/2017 (H3N2)**
- B/Colorado/06/2017 (línatge Victòria)

L'OMS recomana que les vacunes antigripals tetravalents portin, com a la temporada anterior, a més de les soques incloses a la trivalent, una soca anàloga a B/Phuket/3073/2013 (línatge Yamagata).

Font: [Recommended composition of influenza virus vaccines for use in the 2019-2020 northern hemisphere influenza season](#)

Grups de risc que cal vacunar (*pendent d'aprovació per la Comissió de Salut Pública*)

- 1. Persones d'edat igual o superior a 60 anys. Cal fer un èmfasi especial en aquelles persones que conviuen en institucions tancades.**
- 2. Persones de menys de 60 anys que presenten un alt risc de complicacions derivades de la grip:**



- Infants (a partir dels 6 mesos) i adults amb malalties cròniques cardiovasculars (exclosa la hipertensió arterial aïllada), neurològiques o respiratòries (inclosos l'asma, la displàsia broncopulmonar i la fibrosi quística).
- Infants (a partir dels 6 mesos) i adults amb:
 - o diabetis *mellitus*
 - o obesitat mòrbida (índex de massa corporal ≥ 40 en adults, ≥ 35 en adolescents o ≥ 3 DE en la infància)
 - o malaltia renal crònica i síndrome nefròtica
 - o hemoglobinopaties i anèmies
 - o hemofília i trastorns hemorràgics crònics, i també receptors d'hemoderivats i transfusions múltiples
 - o asplènia
 - o malaltia hepàtica crònica, inclòs l'alcoholisme crònic
 - o malalties neuromusculars greus
 - o immunosupressió (inclosa l'originada per la infecció pel VIH, per fàrmacs —inclòs el tractament amb eculizumab— o en els receptors de trasplantaments)
 - o càncer i hemopaties malignes
 - o implant coclear o en espera de l'implant
 - o fístula de líquid cefalorraquidi
 - o malaltia celíaca
 - o malaltia inflamatòria crònica
 - o trastorns i malalties que comporten disfunció cognitiva: síndrome de Down, demències i altres

En aquest grup, cal fer un èmfasi especial en aquelles persones que necessitin seguiment mèdic periòdic o que hagin estat hospitalitzades l'any precedent.

- Infants i adolescents, de 6 mesos a 18 anys, que reben tractament prolongat amb àcid acetilsalicílic, per la possibilitat de desenvolupar una síndrome de Reye després de la grip.
- Persones de qualsevol edat institucionalitzades de manera perllongada.
- Dones embarassades en qualsevol trimestre de gestació.

3. Persones que poden transmetre la grip a aquelles que tenen un risc alt de presentar complicacions:

- Personal dels centres, serveis i establiments sanitaris (incloses les oficines de farmàcia), tant d'atenció primària com especialitzada i hospitalària, pública

i privada. Cal fer un èmfasi especial en el personal que atén pacients d'alguns dels grups d'alt risc descrits anteriorment.

- Persones que, per la seva ocupació, treballen en institucions geriàtriques o en centres d'atenció a malalts crònics, especialment les que tinguin contacte continu amb persones vulnerables.
- Estudiants en pràctiques en centres sanitaris.
- Persones que proporcionin cures domiciliàries a pacients d'alt risc o a gent gran.
- Persones que conviuen a la llar, inclosos els infants a partir dels 6 mesos d'edat, amb d'altres que pertanyen a alguns dels grups d'alt risc, per la seva condició clínica especial (esmentades al punt 2).

4. Altres grups als quals es recomana la vacunació:

- Persones que treballen en serveis públics essencials, especialment en els subgrups següents:
 - o Forces i cossos de seguretat de l'Estat i policies autonòmica o local
 - o Bombers
 - o Serveis de protecció civil
 - o Persones que treballen en els serveis d'emergències sanitàries
 - o Treballadors d'institucions penitenciàries i d'altres centres d'internament per resolució judicial (inclosos els centres d'acolliment d'immigrants)
- Persones amb exposició laboral directa a aus domèstiques o porcs, en granges o explotacions avícoles o porcínes, i també a aus salvatges. La finalitat és reduir l'oportunitat de coinfecció de virus humà i aviari o porcí, i disminuir la possibilitat de recombinació genètica de tots dos virus.

Es recomana que les persones que pertanyen al grup de serveis públics essencials siguin vacunades pels mateixos serveis sanitaris que els corresponguin.

Malgrat l'existència de recomanacions d'algunes institucions, es recorda que per a la campanya antigripal 2019-2020 no es considera grup de risc –a l'efecte de rebre la vacunació antigripal de manera sistemàtica– la població sana, infantil o adulta de menys de 60 anys, no inclosa en els apartats 1, 2 i 3.

Vacunes distribuïdes pel Departament de Salut per a la campanya de vacunació de l'any 2019-2020

La Generalitat de Catalunya adquireix les vacunes mitjançant un concurs públic. En el concurs d'aquest any, els lots de vacunes que s'han adjudicat són:

Vacunes trivalents

- 600.000 dosis de vacuna Chiroflu® de Seqirus
Vacuna antigripal d'antigen de superfície, inactivat.

Vacunes trivalents d'immunogenicitat reforçada

- 600.000 dosis de vacuna Chiromas® de Seqirus
Vacuna antigripal d'antigen de superfície, inactivat, amb adjuvant MF59C.1.

Vacunes tetravalents

- 18.000 dosis de vacuna Vaxigrip Tetra® de Sanofi
Vacuna antigripal tetravalent de virus fraccionats, inactivats.
- 2.000 dosis de vacuna Flucelvax Tetra® de Seqirus
Vacuna antigripal d'antigen de superfície, inactivat, preparada en cultius cel·lulars.

Les vacunes Chiroflu® i Chiromas® es distribuïran amb agulles amb sistemes de bioseguretat que se serviran en caixes independents:

- Chiroflu®: amb agulla de bioseguretat de color taronja.
- Chiromas®: amb agulla de bioseguretat de color blau.

Vegeu la indicació d'ús de la vacuna antigripal per tipus a la taula 1.

Taula 1. Indicació d'ús de la vacuna antigripal per tipus

Nom comercial	Edat recomanada	Via d'administració	Tipus de vacuna	Població destinatària
Chiroflu®	A partir dels 6 mesos	Intramuscular o subcutània profunda	Subunitats	Cal administrar-la a totes les persones amb indicació de vacunació.
Chiromas®	A partir dels 65 anys (No hi ha estudis que en validin l'administració abans d'aquesta edat.)	Intramuscular	Subunitats d'immunogenicitat reforçada (adjuvada)	Cal utilitzar-la en persones ≥ 65 anys Se n'ha de prioritzar l'ús en persones d'edat avançada o que pertanyin a grups de risc.
Vaxigrip Tetra®*	A partir dels 6 mesos	Intramuscular o subcutània	Fraccionada tetravalent	• Personal sanitari en contacte amb pacients d'alt risc (hematologia, oncologia, trasplantament...) i aquests pacients <65 anys • Dones embarassades amb altres factors de risc de patir complicacions derivades de la grip • Pacients <65 anys amb factors de risc amb patologia greu
Flucelvax Tetra®*	A partir dels 9 anys	Intramuscular	Subunitats tetravalent de cultiu cel·lular	• Personal sanitari en contacte amb pacients d'alt risc (hematologia, oncologia, trasplantament...) i aquests pacients <65 anys • Dones embarassades amb altres factors de risc de patir complicacions derivades de la grip • Pacients <65 anys amb factors de risc amb patologia greu

* Aquesta campanya es disposa de 20.000 dosis de vacunes tetravalents, les quals amplien la possibilitat de cobertura sobre les possibles soques circulants a la temporada gripal. Per aquest motiu, es prioritza l'ús d'aquestes vacunes en grups on la vacunació pot tenir més impacte.