

Annex 6. ACTUACIÓ INICIAL DAVANT LA SOSPITA D'INFECCIÓ PER CORONAVIRUS SARS-CoV-2

- A.** Qualsevol persona que presenti un quadre clínic compatible amb una **infecció respiratòria aguda** (inici sobtat de qualsevol dels següents símptomes: tos, febre, dispnea) de **qualsevol gravetat**

i

Compliment en els 14 dies previs a l'inici dels símptomes algun dels següents criteris epidemiològics:

1. Història de viatge a **àrees amb evidència de transmissió comunitària**. Les àrees considerades actualment es poden consultar al següent enllaç:
<https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-China/areas.htm>
2. Història de **contacte estret *** amb un cas probable o confirmat.

- B.** Qualsevol persona que requereixi hospitalització per una infecció respiratòria aguda amb criteris de gravetat (pneumònia, síndrome de distrès respiratori agut, fallida multiorgànica, shock sèptic, ingrés a UCI, o èxitus) en què s'hagin descartat altres possibles etiologies infeccioses que puguin justificar el quadre (resultats negatius com a mínim per a Panel Multiplex de Virus respiratoris, incloent grip).



NO COMPLEIX CRITERIS

Diagnòstic diferencial amb altres malalties infeccioses



SÍ QUE COMPLEIX UN DELS TRES CRITERIS DESCRITS EN EL QUADRE ANTERIOR (A O B).

Aïllament del pacient

- El professional ha d'evitar el contacte amb documentació/objectes personals del pacient
- Protecció amb **mascareta quirúrgica** el pacient i el professional que l'acompanya mantenint una distància de **2 metres**.
- **Aïllat** en una consulta o sala restringida
- El pacient ha d'evitar el contacte amb persones i objectes
- Netejar i desinfecció de la zona

Notificació URGENT a l'Agència Salut Pública (ASPCAT)

- **Trucar a:**
Laborable de **8 a 15 hores**, Xarxa de Vigilància Epidemiològica de Catalunya corresponent (annex 1)

Laborable de **15 a 8 hores i festiu 24 hores**, SUVEC.
Tel. 627480828.
- Enviar el **formulari** de notificació de cas (annex 2)

suvec.salut@gencat.cat
epidemiologia@gencat.cat

PROTECCIÓ DELS PROFESSIONALS SANITARIS

- Exploració del pacient:
-**Mascareta FFP2**
-Bata resistent als líquids
-Guants
-Ulleres antiesquixades
- Procediments mèdics que generin **aerosols** (nebulitzadors, intubació traqueal, rentat broncoalveolar, ventilació manual):
-**Mascareta FFP3** i, si no hi ha disponibilitat, FFP2.
-Protecció ocular ajustada de muntura integral o protector facial complet.
-Guants
-Bates impermeables de màniga llarga (si la bata no és impermeable i es preveu que es produeixin esquixades de sang o altres fluids corporals, cal afegir un davantal de plàstic).



ASPCAT

- Confirma** el compliment de criteris i **activa l'alerta**
- Coordina el trasllat amb el SEM al centre hospitalari, si s'escau³
- Inicia la recerca i el seguiment de contactes

1. CONTACTE ESTRET:

- Qualsevol persona que hagi proporcionat **cures** a un cas probable o confirmat mentre el cas presentava símptomes: treballadors sanitaris que no van utilitzar mesures de protecció adequades, membres familiars o persones que tinguin un altre tipus de contacte físic similar.
- Qualsevol persona que hagi estat en el mateix lloc que un cas probable o confirmat mentre el cas presentava símptomes a una distància **< 2 metres** (p. ex. convivents, visites).
- Els passatgers d'un avió situats durant el vol en un **radi de dos seients** al voltant d'un cas probable o confirmat mentre que el cas presentava símptomes i també la tripulació que hagi tingut contacte amb aquests casos.

2. CASOS:

- **Cas en investigació:** qualsevol persona que compleixi algun dels criteris de cas en investigació A o B.
- **Cas confirmat:** cas que compleix criteri de laboratori.

PCR de *screening* positiva i PCR de confirmació en un gen alternatiu al de *screening* també positiva.

- **Cas probable:** cas en investigació en què els resultats de laboratori per al coronavirus SARS-CoV-2. són o no concloents o només són positius per a una prova genèrica de coronavirus.
- **Cas descartat:** cas en investigació en què les proves de laboratori no detecten la infecció pel coronavirus SARS-CoV-2.

3. TRASLLAT DEL SEM:

- **Si el cas ha estat atès al CAP**, s'ha de traslladar al **centre hospitalari de referència** sempre que disposi d'habitacions amb pressió negativa o directament al **Hospital Clínic de Barcelona**, segons la valoració del metge epidemiòleg.
- **Si el cas ha estat atès a un centre hospitalari sense habitacions amb pressió negativa**, s'ha de traslladar a l'Hospital Clínic de Barcelona.
- En ambulància, amb la **cabina del conductor físicament separada** de l'àrea de transport del pacient.
- El personal n'ha d'estar informat prèviament i ha de portar un **equip de protecció individual** (mascareta FFP2, bata resistent a líquids, guants i protecció ocular amb ulleres antiesquixades).
- En finalitzar el transport, cal desinfectar el vehicle i fer la gestió dels residus produïts (cal tractar-los com a **residus biosanitaris especials de classe II**).