CRITERIOS INCLUSIÓN Y EXCLUSIÓN CONTACTOS ASINTOMÁTICOS

CRITERIOS INCLUSIÓN

1. Pacientes que cumplen el criterio de **contacto** acorde a las guías del *Departament de Salut Pública de Catalunya*¹ con un caso confirmado.
2. Con una exposición de riesgo en los últimos **5 días**
3. Que **no tienen síntomas de infección respiratoria** aguda (fiebre, tos, disnea).
4. Individuos ≥ 18 años y capacitados para dar su consentimiento.
5. En mujeres en edad gestacional, prueba negativa de embarazo y compromiso en el uso de medidas anticonceptivas durante la duración del estudio².
6. Voluntad para tomar los tratamientos del estudio.
7. Voluntad para cumplir con los procedimientos del estudio.
8. Capacidad para dar consentimiento informado tanto oral como escrito.

CRITERIOS DE EXCLUSIÓN

1. Arritmia cardíaca conocida con prolongación del QT (Síndrome QT largo)
2. Incapaz de tomar medicación oral
3. Presentar sintomatología en el momento actual
4. Participantes con
 - a. Insuficiencia hepática grave (Child-Pugh C).
 - b. Insuficiencia renal grave grado 4, (FG ≤ 30 ml/min/1.73m²) o necesidad de diálisis.
 - c. Psoriasis
 - d. Miastenia gravis
 - e. Enfermedades de retina
 - f. Discrasias sanguíneas
 - g. Pérdidas auditivas neurosensoriales
 - h. Déficit de glucosa 6-fosfato deshidrogenasa
5. Embarazo o lactancia³.
6. Incapacidad o inhabilidad para cumplir con los procedimientos del estudio
7. Participantes tratados en los últimos 30 días con hidroxiclороquina.
8. Hipersensibilidad a la hidroxiclороquina
9. Está tomando alguno de los siguientes fármacos con riesgo de interacción.
 - a. **Antiarrítmicos:** Amiodarona, Sotalol
 - b. **Opiáceos:** Metadona, Tramadol
 - c. **Antidepresivos /deshabitación:** Citalopram, Escitalopram, Bupropion
 - d. **Antipsicóticos:** Clozapina, Haloperidol
 - e. **Antivirales:** Efavirenz, Saquinavir
 - f. **Antibióticos:** Quinolonas, (levofloxacino, moxifloxacino)
 - g. **Otros:** Anagrelide Ivabradina Mifepristona, Cisapride

¹http://salutpublica.gencat.cat/web/.content/minisite/aspcat/vigilancia_salut_publica/alertes_salut_publica/Nou-coronavirus-2019-nCoV/Procediment-actuacio-nCoV.pdf

² Métodos anticonceptivos incluyen preservativos masculinos o femeninos, con o sin espermicida, dispositivo intrauterino, ligadura tubárica bilateral, pareja vasectomizada y abstinencia sexual durante el estudio.

³ Aunque la cloroquina ha sido usada en mujeres embarazadas para la prevención de la malaria, existen pocos datos en sus efectos sobre el feto durante el primer trimestre.